

女
科
百
問

女科百問

為軒岐之言者曰寧醫十丈夫不醫一嬰兒寧醫
十嬰兒不醫一女婦夫然則女病之難治也蓋
此於丈夫之數者百人中不能一也彼有十
人者何如哉等入耳非知十九人之難為治也蓋
醫之候病止於脈通氣順為下然望聞問三事
外施諸丈夫嬰兒而每窮於女婦彼朱門艷質青
樓靜妹聲咳莫聆色笑誰覲望與聞既以嫌遠矣
所恃問之一道而其受病也不於牀第不可說之
施則為悒鬱莫能喻之察其為證候也非關經產

即屬帶淋可云某事曾否有無某處如何痛癢某物若爲色狀問之則醫危不問則病危雖然胡可問也於是病者擇言而授指妳嫗妳嫗展轉而傳語主人主人未言先頰其面欲言更慙其詞烏三變而成白尚有眞病入於先生之耳哉三指之下所得幾許又安能淺深細按如丈夫嬰兒之得從容談笑以究其故也無已而爲之說曰醫者意耳夫舍曰術而至求之於意無惑乎其難之也矣南宋齊公重閣此情設爲百問次以受病之因次以治病之法有不可問者百問問之有不便答者百

答答之使人自曉其因而人自諳其治可無煩
生之三指也詎不賢於四術也耶是故女科之書
充棟皆活一人者也百問成而九十九人者生矣
崇禎庚辰歲三月十日爲予懸弧之歲之月之日
烏程閔齊伋序

女科百問序

齊仲甫先生在宋爲醫局教授分治婦人一科嘗
撰女科百問二卷。唐寶維錄藥方一卷。往藏於吾
鄉少司馬容菴金公家。訥齋翁取而錄之。每遇國
中女婦諸證。凡與所問答相合者。卽用其方療之。
靡不立効。嘗語太保石岡公曰。此書有功濟陰。盍
梓之以傳。太保歷宦南北。宣猷不暇。幾欲成翁之
志。不果。茲問卿小石君疏允乞間。因檢故篋。始取
而刻之。曰。此吾祖父志也。刻成持以過我。屬引其
端。余惟醫家立論處方。書之種類多矣。自黃帝岐

伯設論反復詞簡義深。是爲醫學之祖。嗣是專門名家。互有誤著。大抵遡其意而推衍之。其實不能外軒岐而別立一說也。顧人生疾病殊科。而婦人所患。比之男子。不啻倍蓰。矧胎產前後。防閑不密。調治失宜。則禍在瞬息。然則先時預待。臨證考求。安得易易圖之。顧其立論處方。散見各書中者。非不明白簡要。而條理節目。或者未詳。以此見聞不廣。學者病焉。仲甫在當時。專領此科。乃深求玄理。廣集舊聞。撰成此帙。用心良苦。觀其借問答而推其致病之繇。據辨證而立以療治之法。論匪無稽。

法咸有據。要之萃前人之意而間以獨得之見參焉。豈非婦人科中之至寶至寶者歟。抑余嘗謂自古在昔。婚姻以時。胎教有法。是以胤嗣端良。災疾罕有。乃今未知爲人父母之道。而有子。方抱孕在身。罔知禁忌。及免身未久。凡百任情。此則教化不明。無怪乎病之易生。而民之多歿也。昔人謂不治已病。治未病。以論胎產。尤爲要語。余覽是書。卓有源流。深探標本。蓋不專恃湯液以爲功者。學者能考其答問之意。取其方而斟酌用之。其圖難於易。難而安。有補造化。豈其微哉。此固先生所望於

後人而亦訥齋翁濟人之本意也。翁姓王氏名綸字廷言。爲吾鄉前輩碩儒。以太保公貴。迭受崇封。饗有遐算。流慶哲孫。克世其家。乃問卿致位通顯。勇退完名。今惟閉門緝學。日以繩武繼志爲心。茲刻亦繩繼之一端也。

隆慶辛未夏六月九日

賜進士出身南京尚寶司卿致仕

詔進朝列大夫前中順大夫南京太常寺少卿改
江西按察司僉事奉

勅提督學政石臧居士許穀撰

女科百問序

醫道肇於上古。經論著於在聖。治醫設官。始於周
於是聖王好生之心。良醫生生之道。達於天下。後
世矣。周末秦越人尤善其事。至邯鄲卽爲婦人醫。
婦室專科。其助於此乎。然未有成書也。濮陽李師
聖施郭稽古產論二十一篇。盛行於世。而產前無
方。至巢氏病源。證詳而方不具。太平聖惠有方面
雜見。外此則未有聞也。更有錄無書。婦人受病。比
卷楊氏產乳集驗三卷。有男子倍多而難治。況產前
尤爲急務。命繫須臾。可

不詳謹恭惟

聖朝列聖繼承。念民疾疢。創學設科。釐爲十三科。各有專習。回視成周。不惟其官。惟其學。不惟其學。惟其科。於是婦室始專科矣。可無成書乎。仲甫分職其科。醫學不敢怠事。輒忘蒙昧。嘗集衆方。纂成一帙。目曰女科百問。又自孕元胎始。氣形將護。產前後諸雜病證。附爲產寶雜錄。雖不敢望古述作之萬一。然剖析酬答。明白易見。庶幾有補萬一。且一病必對數藥。區區本志。本爲病家居處僻左。有是證。用是藥。雖非醫家。亦能愈疾。免致束手無措。

故著爲此書。旣欲其行於
上進。惟是寡陋孤聞。慮考
同志。能逌而證者。不亦爲
庚辰春二月吉旦太醫局

世豈可不聞於朝。衛
訂未詳。方證訛舛。高明
萬世之幸矣乎。昔嘉泰
教授齊仲甫謹序

科百問目上

第一問精血以分男女之本源

第二問古法男三十而娶女二十而嫁

第三問婦人感病倍於男子

第四問何以謂之天癸

第五問何以謂之經候

第六問經候或前或後多寡不定

第七問月水依時來不快利

第八問經水欲行先身體痛或腹痛

第九問月水閉絕不通

第十問虛勞之病何以別之

第十一問婦人卦數已盡經水當止而復行

第十二問何謂避年

第十三問室女經候當行不行

第十四問未出閨門女有三病

第十五問婦人多驚

第十六問婦人多因風冷而生諸疾

第十七問婦人多頭眩而冒

第十八問婦人身體疼痛流注不定

第十九問朝食暮吐

第二十問婦人之病多因氣生

第二十一問猝然而死少閒復甦

第二十二問病非瘧之邪四時多病寒熱

第二十三問因咳嗽經候不行

第二十四問咳嗽有紅痰

第二十五問吐血衄血齒衄舌上出血汗血

第二十六問婦人偏喜酸物或嗜冷

第二十七問婦人喜少怒多悲泣不止

第二十八問咽中狀如梅核或如炙肉

第二十九問婦人足十指痛如油煎覆之則熱

痛風吹則冷痛

第三十問婦人少年髮少

第三十一問四肢如故但腹脹者

第三十二問病有血分有水分何以別之

第三十三問心腹痛或又有小腹痛

第三十四問下利經水反斷

第三十五問婦人晝則明了暮則譫語如見狀

第三十六問癲狂之病

第三十七問有一臂痛有兩臂俱痛

第三十八問婦人病渴與三消之病同異

第三十九問腰痛如折

第四十問婦人面多生黑𦘔與黑子

第四十一問身目黃

第四十二問陰崩陽崩何以別之

第四十三問眠臥多汗

第四十四問左脅痛如刀刺不得喘息

第四十五問積聚之病何以別之

第四十六問身體常癢痒

第四十七問夜與鬼交

第四十八問大小便不通

第四十九問帶下三十六疾

第五十問婦人有帶下或淋漓不斷何以別之

女科百問卷上

門生翰林醫證入內內宿壽明慈睿殿應奉
侍衛步軍司醫官兼太醫局教授齊仲甫撰

○第一問精血以分男女之本源者何也

答曰男子以精爲本女子以血爲源男子爲陽陽
中必有陰陰中之數八故一八而陽精降二八而
陽精溢女子爲陰陰中必有陽陽中之數七故一
七而陰血升二七而陰血溢陽精陰血皆飲食五
味之實秀爲男女之本源也方其升也智慮開明
齒牙更始髮黃者黑筋弱者強暨其溢也凡充身

肢體手足耳目之餘雖針芥之處無有不至。凡子形肖父母者。蓋其精血嘗於父母之身。無所不歷也。是以父一肢廢。則子一肢不肖其父。母一目虧。則子一目不肖其母。然雌雞牝獸。無天癸而成胎。何也。鳥獸精血往來尾間也。精未通而遇女子。通其精。則五體有不滿之處。異日有難狀之疾。陰已痿而思色以降其精。則精不出而內敗。小便道澀而爲淋。精已耗而復竭也。女人天癸既至。踰十年無男子合。則不調。未踰十年男子合。亦不調。不調則舊血不出。新血誤行。或潰而入骨。或變而爲

腫。或雖合而難子。合男子多。則瀝枯虛人產乳衆。則血枯殺人。觀其精血。思過半矣。

○第二問古法男子三十而娶。女子二十而嫁者。何也。

答曰。天以剛陽爲尊。地以柔陰而卑。則乾坤之體定矣。若天不剛陽。地不柔陰。是乾坤之體不定矣。夫乾道成男。男自子位左旋。積三十歲而至巳。所以男及三十而娶。當是之時。天陽已剛也。坤道成女。自子位右旋。積二十歲而至巳。所以女二十而嫁。至斯之際。地陰以順也。故及其時得子。皆強所

謂乾坤之體定矣。不及其時而嫁娶者。則剛陽柔陰必有所虧也。

○第三問婦人感病倍於男子者何也。

答曰。夫婦人者。衆陰之所集。常與濕居。十四以上陰氣浮溢。百想經心。內傷腑臟。外損姿容。月水去留。前來交互。瘀血停凝。中道絕斷。其中傷墮。不可具論。冷熱臟腑虛。飲食無度。損傷甚。一或胎瘡未愈。含其陰陽。或行步風來。便利於縣。疾作二疾所以婦人別立其科也。若是四時節氣。

虛實冷熱爲患者。故與丈夫治法同也。惟妊娠而挾病者。避毒藥。恐或傷胎耳。大抵婦人以其慈戀憎愛疾妬憂恙。染着堅牢。情不自制。所以爲病根深。療之難差。故倍於男子之病者。此也。

○第四問何以謂之天癸

答曰。謂壬癸北方水干也。壬爲陽水。配丁而化木。癸爲陰水。合戊而化火。經云。水火者。陰陽之證兆也。且婦人者。衆陰之所集。以陰類陰。故得水之癸干也。女至二七。腎氣全盛。衝任流通。經血漸盈。應時而下。天真之氣。殊降與之從事。故云天癸也。內

經云二七而癸至任脉通太衝脉盛月事以時下故有子然衝爲血海任土胞胎陰靜海滿二者相資故令有子

○第五問何以謂之經候

答曰夫女子十四天癸至腎氣全盛衝流任通血漸盈應時而下常以三旬一見愆期者病故謂之經候然經者常也候者謂候一身之陰陽也經常之氣伺候而至若潮候之應平時也天真之氣與之流通故一月一次行平和則不失乎期所以謂之經候又名月水也

第六問經候或前或後多寡不定者何也

答曰夫婦人病多是月經乍多乍少或前或後時發疼痛醫者一例呼為經病不曾說得是陰勝陽是陽勝陰所以服藥少得有效蓋陰氣盛乘陽則胞寒氣冷血不運行經所謂天寒地凍水凝成冰故令乍少而在月後若陽氣盛乘陰則血流散溢經所謂天暑地熱經水沸溢故令乍多而在月前當和其陰陽調其氣血以平為福

陽氣勝陰月假多者當歸飲抑陽助陰調理經脉

當歸

去蘆 微炒

熟地

淨洗酒 蒸焙乾

川芎

白芍

黃芩

小半

白朮

各等分

右爲麤末。每服三錢。水盞半煎至八分。食前熱服。

沉香降氣湯。順氣道。通氣脉。

烏藥

沉香

香附

甘草

砂仁

各等分

右爲細末。每服二錢。空心鹽湯調下。

陰氣勝陽。月假少者。七物湯。治婦人榮衛氣虛。經水愆期。或多或少。而腹痛。

當歸

芎藭

白芍

蓬朮

川薑

熟地

酒蒸焙乾

木香

各等分

右為麤末

每服

四錢水

一盞煎

八分溫服

不

拘時

紫石英圓治婦人病多是月經乍少或在月後

時發疼痛

紫石英

水研飛

禹餘糧

燒醋淬

人參

龍骨

川烏頭

泡去皮尖臍

桂心

不見火

杜仲

去皮薑製炒黑

桑寄生

五味子

遠志

去心

澤瀉

當歸

去蘆

石斛

去根酒炒

菴蓉

酒洗

乾薑

炮各一兩

甘草

炙半兩

川椒

去目并合口炒地上出汗

牡蠣

固濟火燒通紅各半兩

右為細末煉蜜為丸

梧桐子大空心米飲下

三十丸至五六十丸

已上無求子方

金華散治婦人經血後熱崩漏不止目苦舌乾經候不通並宜服之

玄胡索

瞿麥

當歸

牡丹皮

石膏

二兩

乾葛

各一兩

蒲黃

半兩

桂心

葳靈仙

各三分凡方中云一分者二錢五分也

右為麤末。每服二錢水一盞薑三片煎至六分空心服

已上養生席判官方

通經丸治婦人室女月候不通疼痛或成血瘕

桂心

火不見

青皮

去白

大黃

炮

乾薑

川椒

炒去目

蓬朮

川烏

泡去皮尖

乾漆

炒去烟出

當歸

桃仁

炒去皮尖已上各等分

右為細末將四分用米醋熬成膏和餘六分末成劑相中治之丸如桐子大陰乾每服二十丸空心食前米飲湯下加至三十丸溫酒

亦得

五靈脂散。治經候不止。拯濟方

五靈脂爲末。炒令過熟。出盡烟。每服二錢。當歸二片。酒一中盞。煎至六分。去滓熱服。連三服立效。如血室有乾血。用醋一盞。煎七分。和滓空心熱服。

溫經湯

治衝任虛損。月候不調。或來多不斷。或過期不來。或崩中去血過多不止。又治曾經損孕。瘀血停留。少腹急痛。發熱下利。手掌煩熱。唇

乾口燥及少腹有寒久不受胎

丹皮

阿膠

碎炒

當歸

去蘆

人參

去蘆

川芎

甘草

炒

肉桂

去粗皮

芍藥

各二兩

吳茱萸

三兩

半夏

各湯洗七次二兩半

麥門冬

去心五兩半

右為麤末每服三錢水一盞半

生薑五片煎

八分去滓空心食前熱服

○第七問月水依時來不快利者何也

答曰婦人月水有四經之所主一者衝任二脉二

者手太陽少陰二經然衝為血海任為主胞胎二

者相資故令有子手太陽者小腸之經為腑而主

表。表屬陽。手少陰者。心之經。爲臟而主裏。裏屬陰。此二經。在上爲乳汁。在下爲月水。或勞傷氣血。致令體虛而受乎風冷。風冷客於經絡。搏於血氣。血得冷則壅滯。故令月水不宜利也。

養榮湯。治婦人血海虛弱。心忪恍惚。時多驚悸。或發虛熱。經候不調。

白芍

川芎

當歸

熟地

青皮

薑黃

川薑

丹皮

海桐皮

五加皮

白芷

右爲咀咀

每服五錢。水盞半。

薑五片。烏梅一

箇煎至一盞去滓溫服不拘時候將此藥送下紫桂丸七十粒

紫桂丸方見四十九問

○第八問經水欲行先身體痛或腹痛者何也
答曰經脉者行血氣通陰陽以榮周身者也血氣盛陰陽和則形體適平或外虧衛氣之充養內乏榮血之灌溉血氣不足經候欲行身體先痛也或風冷之氣客於胞絡損傷衝任之脉及手太陽手太陰之經故月水將下之際血氣與風冷相擊所以經欲行而腰痛也

趁痛飲子治經脉虛寒身體疼痛

虎骨 五銖

茯苓

甘草

藁本

防風

白芷

各二銖

當歸

白芍

續斷

吳木

附子

各三銖

右為麤末。每服五錢。水二盞。薑五片。棗二枚。

煎至一盞。去滓溫服。不拘時。

溫經湯治風寒客搏經絡小腹作痛

當歸

川芎

白芍

官桂

丹皮

蓬朮

各半兩

人參

甘草

牛膝

各二兩

右為麤末。每服五錢。水二盞。煎八分。食前服。

沒藥除痛散逐寒邪療腹痛

蓬莪茂

兩炮一

當歸

焙

玄胡索

五靈脂

肉桂

良薑

炒

蒲黃

炒各七錢半

甘草

沒藥

各半兩

右為細末每服三錢溫酒調下

楊氏謂婦人每經欲行必先腹痛令服撞氣阿魏圓酒調大聖散下數服愈經行不復痛矣

撞氣阿魏圓

大聖散

見宋局方婦人門

茴香

炒

陳皮

去白

青皮

去白

芎

丁香

皮炒

蓬莪朮

炮

甘草

縮砂仁

肉桂

去粗皮

白芷

炮各半兩

生薑

四兩切鹽半兩醃一宿炒黑

胡椒

二錢半

阿魏

二錢半醋浸一宿以麝同為糊

右末阿魏糊為圓雞豆大每藥一筋硃砂七

錢爲衣常服一粒嚼爛醋湯茶酒任下

滋血湯治血風虛經候澁滯經脉不通四肢麻

木肌體渾身疼痛倦怠將成癆瘵

馬鞭草

荆芥穗

各四兩

丹皮

兩

赤芍

枳殼

肉桂

當歸

川芎

各二兩

右爲麤末每服四錢烏梅一箇水煎食前服

琥珀散治月經擁滯心腹疼痛及治產後惡露

不快血上搶心迷悶不省氣絕欲死

京三稜

煮

蓬朮

煮

赤芍藥

煮

劉寄奴

煮

牡丹皮

煮

官桂

菊花

蒲黃

熟地

當歸各一

右將前五味用烏豆半升生薑半觔切片米醋四升同煮豆腐爛爲度焙乾入後五味同爲末每服二錢溫酒調下

○第九問月水閉絕不通者何也

答曰夫月水不通因風冷客於胞絡或因血枯血癢血癥或因墮墜驚恐皆令月水不通也病源云血性得溫宜流得寒則澀閉旣爲冷所結搏則月水不得通行若腸中鳴者則月事不來不來因冷于於胃腑或醉入房者則內氣耗損

勞傷於肝經。或吐血唾血下血。謂之脫血。使血枯於中。為積塊血瘕。血瘕名曰血聚。使榮結於內。心主行血。墮墜驚恐。神無所倚。而血散。亦令月水不通也。

順榮湯。治婦人血積血塊。瘕瘕腹大。內有塊形。築築作痛。久無寒熱。

大黃

一兩酒浸
蒸熟到

當歸

一兩

葶芩

半兩

鬼腰帶

各一兩腰帶
一本作箭

枳殼

一兩去
穢炒

赤芍藥

半兩猪牙皂角
上炙者

桂為咬咀

每服一兩。純酒二盞煎至一盞。去

萍食前溫服

滋血湯。治勞過度。致傷腑臟。衝任氣虛。不能約制其經。血忽暴下。謂之崩中。或下鮮血。或下瘀血。或下血片。或下五色。連日不止。淋瀝不斷。形氣羸劣。倦怠困乏。或月水閉絕。氣不升降。

馬鞭草 牛膝

荆芥穗

各四兩

丹皮 赤芍

枳殼

肉桂

當歸

川芎

各二兩

每服四錢。烏梅一箇。水煎空心服。至半月或一月。經脉自通。

桃仁煎丸。治血瘀血積。經候不通。

桃仁

去皮尖
麩炒黃

大黃

濕紙
裹蒸

川朴硝

各一兩

蝨蟲

半兩
炒黃

右爲末。以醇醋二升半。銀石器中慢火煎取一升半。下大黃桃仁蝨蟲等。不住手攪。欲圓。下朴硝。更不住手攪。良久出之。圓如桐子大。前一日不用吃晚食。五更初。用溫酒吞下五粒。日午取下。如赤豆汁。雞肝蝦麻衣。未下再服。血鮮紅卽止。續以調氣血藥補之。此千金方出。

萬病丸

見六問中

○第十問虛勞之病何以得之

答曰夫有勞役之勞有勞傷之勞役之勞所用太過臟腑之氣失其常度所以致疾虛則已有所虧勞則因有所損其積之有漸成之有日豈一朝一夕而驟致哉巢氏云五勞六極七傷謂之虛勞也今尋原指要而論之若腹脇有塊大小成形按之不動推之不移久久令人寒熱如瘧咳嗽面目浮腫動輒微喘日就羸瘦此繇暴怒驚恐氣上而不下動傷於肝氣聚而不散結而成形積久而變勞

又有日頓羸瘦。氣短乏力。腰背牽急。膝脛酸痿。小便或赤。或白而濁。帶下不禁。夢與鬼交。翁翁如熱。骨肉煩疼。此錄房勞過度。精耗氣竭。得之於腎。爲勞尤速也。

栢子仁圓。治婦人血閉不通。漸成癆瘵。

栢子仁

別研當歸洗

熟地

白茯苓

丹皮

卷栢

白芍藥

石斛

巴戟

去心

肉苁蓉

酒浸

山藥

杜仲

白薇

蒲黃

枳殼

肉桂

京三稜

煨

蓬朮

煨

覆盆子

枸杞子

各一兩

附子

右六細末煉蜜丸梧桐子大每服五十九溫

酒或米飲下空心食前

人參劉散去熱解勞調順經水滋養新血藥性
中和退熱無大寒極冷之劑

黃耆

三分

黃芩

赤茯苓

白朮

熟地

赤芍藥

麥冬

各一兩

柴胡

半兩

人參

知母

當歸

甘草

炙各三錢五分

右並生剉如麻豆大焙乾入磁器中收每服
四錢水一盞半竹葉燈心三寸長各七莖同

煎七分。去滓溫服。不拘時候。日三服。如病退不必服。

香煎治暴怒驚恐氣逆上而不下。動傷於肝。氣聚而不散。結而成形。

石斛

五兩

川椒

炒去目

附子

炮去皮臍

秦艽

去上

柴胡

去苗

沉香

去目

木香

鱉甲

去炙刮去筋膜

黃耆

二兩

枳郎

各二兩

右爲細末。先用新枸杞十觔。洗略槌碎。法酒二斗。煮取七升。取枸杞根。別用法酒三升。洗拍令淨。與酒一處。更入蜜四兩。煮成膏。和前

件藥求。九如桐子大。

飲一三十九食前。

二服。一方加柴胡二

兩。

方婦人患脾血

病時覺腹痛惡心五

心煩熱如勞之狀或進

或退經候行而食驚

恐所致令服局方四物

湯加吳茱萸同煎溫服病愈

逍遙散

四物湯加柴胡

又正方

白茯苓

白朮

白芍

柴胡

當歸

甘草

人參

每服用煨薑一塊薄切少許不拘時煎服

膠艾湯治勞傷氣血衝任虛損月水過多淋瀝漏下連日不斷腹臍疼痛及妊娠將攝失宜胎動不安腹痛下墜勞傷胞絡胎損漏血腰痛悶亂因損動胎上捨心奔衝短氣因產衝任氣虛不能約制經血淋瀝不斷延引日久漸成羸瘦

熟地

白芍

當歸

艾葉

微炒

阿膠

炒黃

芎藭

甘草

炙各二兩

右爲呖咀每服四錢水一盞酒六分煎八分

去滓食前熱服甚者連服內補當歸丸見五

十三問

○第十一問婦人卦數已盡經水當止而復行者何也

答曰經云男子生於寅寅爲木陽也女生於申申爲金陰也寅屬木陽中有陰男子得八數故八歲齒更髮長骨之餘生齒男子以氣爲本八八則卦數已盡盡則陰精痿申屬金陰中有陽女子得七數七歲齒更髮長血之餘生髮女以血爲主七七則卦數以終終則經水絕止內經云七七任脉虛太衝脉衰少天癸竭地道不通故形壞而無子也或勞傷過度喜怒不時經脉虛衰之餘又爲邪氣

攻衝所以當止而不止也

茸附養真湯補衝任調血氣

乾薑

四兩

肉桂

當歸

附子

炮各二兩

鹿茸

三兩酒炙

牡蠣

煅二兩

防風

二兩

龍骨

生二兩

右爲咬咀每服半兩水二大盞煎至八分去

滓不拘時溫服

補中芎藭湯治風虛冷熱勞損衝任月水不調

崩中暴下產後失血過多虛羸腹痛或妊娠胎

動不安血下

當歸

乾薑

炮各二兩

川芎

黃芪

蜜炙

茱萸

湯洗七次

白芍

甘草炙

熟地

杜仲

炒令絲斷

人參

各一兩

右為咬咀每服三錢水盞半煎一盞去滓熱

服空心食前

當歸散天癸已過期經脉不勻或三四月不行或一月再至問云七損七益謂女子七數盡是經候不依時者血有餘也不可止之但令依時不腰痛為善

當歸

川芎

白芍藥

各一兩

白朮

半兩

重白朮

黃芩

各剉碎炒各一兩如令去芩加官桂

白朮

半兩

山茱萸

炮一兩半

女科百問

七十六

右爲細末每服二錢酒調下空心服一日三服

第十二問何謂避年

答曰王氏云有一婦人女年十五歲來診言女年十四時經水自下今經反斷其母言恐怖師曰此女爲是夫人親女非耶若親者當相爲說之婦人答言是自女耳師曰所以問者無他夫人年十四亦以經水下所以女至此而斷是謂避年勿怖後當自下

拱辰丹夫方當壯年而真氣猶怯此乃賦稟素

藥非虛衰而然也。僭燥之藥尤宜速戒。勿謂手足厥逆便云陰多。如斯治之不惟不能愈疾。大病自此生矣。滋益之方。羣品稍衆。藥力微細。難見功效。但固天元一氣。使水升火降。則五臟自和。百病自去。此方主之。行在孫琳郎中方。葛丞相夫人少時服之。極効。

鹿茸

酥炙去皮
毛四兩

山茱萸

新好紅
者四兩

當歸

四兩

麝香

半兩
別研

右三件爲末。入麝拌和。酒煮麪糊爲丸。如桐子大。每服一百粒。或五十粒。溫酒或鹽湯下。

○第十三問室女經候當行不行者何也

答曰室女者乃未出閨門之女也不以妍醜至十四五歲容貌皆紅嫩者謂之質朴未散莊子云縛約如處子者是也當此之際經脉來時俗呼為紅脉或因驚恐或冷氣擊搏所以當行而不行也

通經圓治婦人室女月候不通疼痛或成血瘕

嚴氏方內加玄胡索赤芍減川烏

桂心不見火 青皮去白 大黃炮 乾薑炮

蓬朮 川烏炮去皮 乾漆炒 當歸

桃仁去皮炒 川椒去目炒出汗各等分

右爲細末。將四分用米醋煮成膏。和餘六分末劑。日中治之。如梧桐子大。陰乾。每服二十丸。用淡醋湯下。加至三十丸。溫酒亦得。食前服。

桃仁散。治婦人室女血閉不通。五心煩熱。

紅花

當歸

杜牛膝

桃仁

別研一

右四味各等分爲細末。每服三錢。溫酒調下。空心食前。

○第十四問。未出閨門女。有三病者。何也。

答曰。未出閨門女。卽室女也。一病者。經水初下。陰

中熱。或有當風。或有扇風者。二病者。太衝脉盛。氣則內熱。以寒水洗之。三病者。或見血下。驚怖。若三病者。有一之所受。後必生帶下之疾也。

神仙聚寶丹。治婦人血海虛寒。外乘風冷。搏結不散。積聚成塊。或成堅瘕。及血氣攻注。腹脇疼痛。小腹急脹。或時虛鳴。嘔吐痰沫。頭旋眼花。腿膝重痛。面色痿黃。肢體浮腫。經候欲行。先若重病。或多或少。帶下赤白。崩漏不止。驚悸健忘。小便頻數。或下白水。時發虛熱盜汗。羸瘦。此藥不論胎前產後。室女。並宜服之。常服安心神。去邪。

氣逐敗血養新血令有子亦能除

諸病

木香

研令末琥珀

別研

當歸

沒藥

別研各一兩

滴乳

一分

麝香

一錢

辰砂

一錢別研

右研令細和滴冷熱水搗為丸

每一兩作一

十五丸每服一九溫酒磨下

胎息不順腹

內疼痛一切難產溫酒和童便磨下不拘時

候產後血暈敗血奔心口禁舌強或惡露

未盡發渴面浮煎烏梅湯和童便磨下產

後氣力虛羸諸藥不效和童便磨下一室女

經候不調每半丸溫酒磨下

○第十五問婦人多驚者何也

答曰婦人者衆陰之所集而以血爲之主。夫心主行血脾主裹血肝主藏血。因產蓐過傷或因喜怒攻損是致榮血虧耗。內經云血氣者人之神。血既不足神亦不定。所以驚怖。巢氏有風驚悸候云。心藏神爲諸臟之主。若血氣調和則心神安定。若虧損則心神怯弱。故風邪乘虛干之。防以驚悸若久不止則變爲恍惚也。

經濟丹治婦人血氣不足榮衛俱虛心氣不定夜臥驚怖夢寐不祥心虛自汗乏力倦怠飲食

減少咳嗽痰實常服補心養血安神定志令人
血壯氣實極有神効

白茯苓

白茯神

白芍藥

各一兩

遠志

去心一兩

乳香

半兩研

當歸

一兩酒浸

酸棗仁

去殼炒半兩

人參

一兩

沒藥

一兩研

硃砂

半兩研

石菖蒲

真者一兩

只用棗仁丸亦得

右十味爲末煉蜜爲丸桐子大將硃砂爲衣
每服三十丸加至五十丸棗湯參湯食前任

下食後亦可

坎離丹既濟水火補心滋腎白濁夢遺

辰砂

另研一兩

酸棗仁

酒浸去殼研一兩淨

附子

一箇去皮臍

乳香

半兩令隔水乳鉢細研入

右先用附子碾細羅末次入三味和勻煉蜜

丸如雞頭大每服一粒溫酒下空心一服須

是臘月合磁器盛之

石斛散治虛勞羸瘦乏力少食倦怠多驚畏

石斛

四錢去根淨洗判酒炒

牛膝

酒浸

栢子仁

去皮研

五味子

遠志炒

杏仁

去皮炒

木香

肉蓯蓉

酒浸焙乾

訶子肉

炮

青橘皮

柴胡

人參

熟地

蒸各錢

白茯苓

四錢

甘草

二錢炙

乾薑

一錢半炮

神龜

研炒

麥蘖

各六錢

右爲細末。每服二錢。米飲

調下。食前日二三

服

○第十六問婦人多因風冷而生諸疾者何也

答曰。風乃陽邪也。冷乃寒氣也。風隨虛入。冷繇勞

傷。夫人將攝順理。則血氣調和。風寒暑濕不能爲

害。若勞傷血氣。便致虛損。則風冷乘虛而干之。或

客於經絡。則氣血凝滯。不能溫養於肌膚。或入於

腹內。則冲氣虧虛。不能消化於飲食。大腸虛則多

利。子臟寒。則不生。或爲斷絕。或爲不通者。隨所傷

而成病皆不逃乎風冷之氣也

補陰丸治婦人百疾或經不調或崩中漏不止腰腿沉重臍腹作痛潮熱往來虛煩自汗中滿氣短嘔噦不時肢體酸疼不思飲食日漸瘦弱此藥順肌體悅顏色調榮衛逐風寒進飲食化痰涎

熟地

生地

各七兩

白朮

五兩

蒼朮

五兩半
汁浸一宿

藁本

去土

牡丹皮

當歸

秦艽

四兩
各

細辛

七兩

肉桂

去皮
八兩

甘草

炙六兩
半

蠶退布

燒存性
七兩

大豆黃卷

炒烟去
六兩半

枳殼

六兩
炒

陳皮

去白
六兩

乾薑

炮

羌活

各五兩

白芷

六兩

白茯苓

六兩

糯米

三升炒黑
色火烟出

右件細末蜜丸每一兩作

十丸每服一丸溫

酒化下醋湯亦得食前

丹鉛丹治一切虛寒冷病

鹿茸

靈砂

白龍骨

川椒

陽起石

牡蠣粉

肉桂

肉蓯蓉

石斛

川巴戟

木賊

澤瀉

天雄

酒浸

沉香

兔絲子

酒浸

臘脯臍

各一兩

磁石

醋淬

麝香

各半兩

右爲細末煉蜜爲丸梧桐子大每服一百丸
溫酒或鹽湯下

○第十七問婦人多頭眩而冒者何也

答曰眩者暈也謂轉運之運世爲之頭運者是也
冒者冒蒙之冒世爲昏冒者是也明理論曰眊非
毛而見其毛眩非玄而見其玄眊謂眼花也眩謂
眼黑也鍼經云上虛則眩下虛則厥眩雖爲虛蓋
風家亦有之者風主運動故也婦人頭運挾痰多
嘔吐者狀若醉頭風也

芎羌散治婦人患頭風者十居其半每發必掉

眩如在車上。蓋因血虛。肝有風邪。襲之。其素弱云。徇蒙拈尤。目瞑耳聾。下實上虛。過在足少陽厥陰。甚則入肝。蓋謂此也。方比他藥捷而効速。

川芎

一兩

當歸

三錢

羌活

旋覆花

細辛

蔓荊子

石膏

生

藥本

荊芥穗

半夏

防風

熟地

甘草

炙各半兩

右爲麤末。每服二錢。水一大盞。薑五片。煎至七分。去滓溫服。不拘時候。氣虛者。此藥送養正丹五七十粒。

玉真圓治腎氣不足氣逆上行頭痛不可忍謂之腎脈其脈舉之弦按之石堅一本作不堅

硫黃

二兩

石膏

硬者不煨研

半夏

湯洗七次各一兩

硝石

一分研

右為細末研和生薑汁糊為丸如桐子大陰乾每服三十丸生薑湯米飲湯下更灸關元穴百壯良方中硫黃丸亦佳

醉頭風餅兒

鹽蠶

去絲嘴

天南星

右件各等分細末生薑自然汁和作餅如折

二錢大厚五分。陰乾。每服一餅。同平胃散四
味者三錢重。水三大盞。薑五片。棗二箇。先煎
平胃散一沸。次下餅子。槌碎入。同煎一二沸。
通口服。

桃紅散。治男子婦人氣虛。攻注頭目昏眩。偏正
頭疼。夾腦風雨。太陽穴疼。眉稜骨痛。及治風痰
惡心。頭運欲倒。小兒傷風鼻塞。痰涎咳嗽。並宜
服之。

川烏

兩一

草烏

錢八

天南星

半兩。以上三味。水洗三次。

麝香

腦子

錢一

朱砂

半兩。別研細。

右爲細末每服半錢薄荷茶調下溫酒亦得
第十八問身體疼痛流注不定者何也

答曰身體疼者其證不一太陽證表未解法當身
體疼痛太陽中濕一身盡痛若脉沉身體自痛
者陰也身重背強腹中絞痛咽喉不利身如被杖
者陰毒證也若風邪乘虛在於皮膚之間淫淫躍
躍若刺一身盡痛傷侵血氣動作如蠱毒之狀者
巢氏謂之風蠱也

虎骨散治婦人血風攻注身體疼痛

虎脰骨

一兩半

桂心

芎藭

海桐皮

當歸

牛膝

天麻

附子

骨碎補

各一兩

羌活

半兩

右爲細末。每服一錢。空心溫酒調下。

透經湯。治身體疼痛。

五積散

半兩

生附子

二錢

右件用水二盞。薑七片。棗二枚。煎至八分。去

滓。入麝少許。再煎三四沸。通口服。不拘時候。

麝香丸。治白虎歷節。諸風疼痛。遊走無定。狀如

蟲。瞤瞤。晝靜夜劇。及一切手足不測疼痛。

川烏

大八角者三箇生

全蝎

二十一箇生

卷一百一十五

黑豆二十粒生

地龍半兩生

左為細末。入麝半字。同研。和糯米糊為丸。如
菉豆大。每服七丸。甚者十九。夜令膈空。溫酒
下。微出冷汗。一身便差。予得此方。凡是歷節
及不測疼痛。一二服便差。在歙川日。有一貴
家婦人。遍身走注疼痛。至暮則發。如蟲蟻其
肌。多作鬼邪治之。予曰。此正歷節病也。三服

愈凡云一字者二分半也

○第十九問。朝食暮吐者。何也。

答曰。嘔吐之病。皆繇三焦不調。脾胃不和。清濁相

予之所致也。大抵嘔吐。本二證。嘔者。嘔而有聲。作所謂哕是也。吐者。吐而有物。胃中虛冷。則吐。若心下牢大如盂。或時寒熱。朝食暮吐。脉如弦緊。則為虛寒相搏。胃氣日虧。所以不能停留水穀。名曰胃反。

紫金丹。治嘔吐。心腹疼。

丁香

木香

華澄茄

胡椒

五靈脂

西者

肉豆蔻

煨

乾薑

炮

半夏末

半兩

附子

炮

硫黃水

銀砂子

二件

如靈砂法。炮

青金頭角。一兩。

右為細末。半夏末。

薑汁打糊。丸如桐子大。每

服七十九。空心米飲下。

薑合圓療中脘停寒胸膈結痞嘔吐惡心不思飲食

木香

肉桂

附子

硃砂

紙上飛各一兩

陳皮

丁香

沉香

華澄茄

青皮

去白各一兩

茴香

一分

右為細末。次入硃砂研。酒煮麪糊為丸。每一兩作二十九。每服一丸。以生薑一塊。剉如盒子。安藥在內。濕紙裹煨。令香。去紙放溫。細嚼鹽湯送下。

○第二十問婦人之病多因氣生者何也

答曰氣以形載形以氣充惟氣與形兩者相待氣和則生氣戾則病結爲積聚氣不舒也逆爲狂厥氣不降也宜通而塞則爲痛氣不達也宜消而息則爲瘕。嬰之爲瘦留之爲瘤亦氣之凝耳。內經曰怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣下寒則氣收熱則氣泄勞則氣耗思則氣結驚則氣亂九氣不同故婦人之病多因氣之所生也

大七氣湯治驚恐恚怒相搏而痛

京三稜

蓬朮

青吉皮

淨洗陳皮

藿香葉

桔梗

官桂

益智

各一兩

香附子

去毛二兩

甘草

半兩

右爲麤末散。每服五錢。水二盞。薑三片。棗一枚。煎至一盞。去滓溫服。

本香順氣散。理衛氣。順三焦。

烏藥

木香

香附子

薑黃

砂仁

甘草

右爲咀咀。每服半兩。水二鍾。薑五片。棗二枚。煎至八分。去滓溫服。不拘時。

紫金丹。治氣癰。氣瘕。蠱脹病。

天台陳秀山傳。到不係產方。

針砂

兩

餘糧石

硫黃

各二兩

右先用藥三件同好醋入鐵鍋內煮乾碾爲末

平胃

散

十兩蓬朮

二兩

縮砂仁

丁香

木香

獨活

黃芪

枳殼

各一兩

白茯苓

大黃

黃連

黑牽牛

甘草

茱萸

檳榔

破故紙

各三兩

乾漆

一兩須好者生漆二兩亦得

右件爲細末同前藥末用酒糊爲丸桐子大每日三五服不拘數如病重則多服忌鹽醬

油麪生冷等物

○第二十一問猝然而死。少間復甦者。何也。

答曰。世言氣逆者。雖不見於方書。然暴喜傷陽。暴怒傷陰。亦氣中之源也。况憂愁不意。氣多厥逆。往往多得此疾。便覺涎潮昏塞。牙關緊急。若槩作中風候用藥。非止不相當。多致殺人。經云。無故而瘖。脉不至。不治。自已。謂氣暴逆也。氣復則已。故猝然而死。少間復甦者。正謂此也。

蘇合香丸。療傳屍骨蒸。殭殍肺痿。疰忤。鬼猝心痛。霍亂吐利。時氣。鬼魅瘴癘。赤白暴利。瘀血月

閉。痲癖下腫。驚癇。鬼忤中人。小兒吐利乳。大人
狐狸等病。

蘇合香油一兩入安白朮二兩丁香二兩

安息香二兩好酒一升為末用無朱砂二兩水

木香二兩白檀香二兩薰陸香一兩

沉香二兩烏犀屑二兩萆薢二兩香附子二兩

訶梨勒煨去核取麝香二兩龍腦一兩

右為細末研藥和用安息膏并煉白蜜和劑

每服旋圓如梧桐子大早朝取并華水溫冷

任意化服四九

○第二十二問病非瘧之邪。四時多病寒熱者。何也。

答曰。風者。陽之氣也。寒者。陰之邪也。陰氣上升入陽中。則發寒。陽氣下陷入陰中。則發熱。陰陽偏勝。寒熱互作。經曰。夏傷於暑。秋必病瘧者。是也。婦人之病。證見寒熱。邪非暑氣者。皆繇榮衛之兆作也。且衛者。氣也。氣爲陽。陽微則惡寒。榮者。血也。血爲陰。陰弱則發熱。故婦人寒熱多。因氣血之所使也。或勞傷而體弱。或經閉而寒熱。若此之類。久而不已。則成虛損之疾也。

必應散。治久寒熱如瘧狀。

熟地

檳榔

陳皮

草果

去皮

當歸

砂仁

甘草

炙

柴胡

以上各等分

右為麤末。每服三錢。水二盞。薑五片。煎八分。去滓。無時溫服。合藥時忌雞犬婦人見。神健飲子。治婦人寒熱。

赤芍

白朮

各二兩

赤茯苓

當歸

肉桂

鱉甲

川芎

枳殼

柴胡

黃芪

秦艽

桔梗

橘紅

甘草

各一兩

木香

右爲咳咀每服三錢水二盞薑五片棗一枚煎至八分去滓溫服不拘時

○第二十三問因咳嗽經候不行者何也

答曰咳嗽之說古書有咳而無嗽後人兼言之大抵皆從肺出其聲響亮不因痰涎而發者謂之咳言其聲音聞於人痰涎上下隨聲而發者謂之嗽如水之嗽蕩能蕩其真氣也况肺主乎氣經云榮氣之行常與衛氣相隨久嗽損氣則血亦不足遂致經閉不行時發寒熱久久成勞者氣血俱損之故也

六神散治婦人熱勞咳嗽月水不調

柴胡去 白朮 青皮去 雷歸

牛膝 牡丹皮各一兩

右為麤末每用六兩入蜜四兩燂令焦入酒

并童便各一碗煎八九沸去滓分作六服空

心食前

藥是圓治

桑白皮炙 木香

貝母 人參 款冬花 葶藶隔紙炒

檳榔各一兩 杏仁炒 天門冬去心一兩 甘草

右爲細末。蜜丸。桐子大。每服三十丸。清米飲送下。食後服。

○第二十四問咳嗽有紅痰者何也

答曰。經稱五臟六腑皆令人咳。原其至理。雖因寒邪之爲患。當分內外所傷。難經云。形寒飲冷則傷肺。肺主皮毛。自皮毛而入中者。謂之形寒。胃脉絡肺。食寒而爲嗽者。謂之飲冷。水飲停積於膈。所以爲痰。痰中有血者。乃心肺之相射也。肺屬金而主氣。心屬火而主血。以五臟而言。心肺皆居膈上。以五行論之。金火應乎相制。故痰中有血者。此

金心勝乎肺久而不已亦變成勞雖經所
謂七傳者死亦此之類也褚氏遺書云喉有竅則
咳血殺人腸有竅則便血羸人便血猶可止咳血
不易醫所以咳嗽有紅痰者多成虛勞之疾也

平肺湯定喘治嗽

五味子

紫苑

洗去土

陳皮

白去

甘草

炙

杏仁

泡去尖

半夏

湯洗七次

紫蘇子

桑白皮

右為末每服二錢水一盞薑四片煎至七分

去滓溫服食後

立驗凡治肺熱而咳上氣喘急不得坐臥身面

浮腫不下飲食消腫下氣止嗽

葶藶十分研

貝母三分

杏仁兩半炒

赤茯苓 紫苑

五味子各三分

人參兩 桑白皮炙一兩

右為細末蜜丸梧子大每服十九日二服

甚者夜一服加至三十九棗湯下腫盛者食

後服

止紅散治心肺客熱咳嗽吐血

柴胡去苗 胡黃連 宣連各半

右為末入硃砂少許餅和每服二錢水一盞

煎半盞通口服

○第二十五問吐血衄血齒衄舌上出血汗血者何也

答曰氣屬乎陽血屬乎陰陰盛則陽虧陽盛則陰虧經所謂陽勝則陰病陰勝則陽病諸吐血衄血鼻出皆謂之妄行其脉洪數者逆微細者順陽明之經行絡於頤頤陽明受邪熱血從齒出也脾氣通於口心氣通於舌心脾二經被傷血故從舌出也榮血內通於臟腑外榮於經絡藏則舍於肝經

行則出於心臟。又心之液爲汗。令肝心二臟俱虛。血隨汗液出也。

內補芎歸湯。治婦人血氣羸弱。或崩傷過多。少氣傷絕。腹中拘急。四肢煩熱。面目無色。及唾血吐血。

芎藭

熟地

各四兩

白芍

五兩

桂心

二兩

甘草

乾薑

各三兩

大棗

四十枚

當歸

二兩

右爲麤末。每服五錢。水一盞半。煎至八分。去

滓溫服。不拘時。

柔脾湯。治吐血下血。衄血。

白芍

黃芪

甘草

各一兩

熟地

三兩

右爲咀咀。每服三錢。水酒各一盞。煎八分。去滓。通口服。不拘時。

琥珀散。治小便出血。

琥珀

猪苓

去皮

茯苓

澤瀉

滑石

各一兩

阿膠

炒三兩

車前子

一兩

右爲麤末。每服五錢。水二盞。煎一盞。去渣。溫服。

○第二十六問。婦人偏喜酸物。或嗜冷者。何也。

答曰。天食人以五氣。地食人以五味者。酸苦甘辛。

鹹是也。五味各有所入。酸入肝。辛入肺。苦入心。甘入脾。鹹入腎。是謂五入也。肝藏血。婦人以血為主。所以偏喜酸物。食者酸入肝而養血。血得其酸物。所以捨藏也。血虛多熱。邪熱蓄於上焦。煩躁內生。婦人虛煩。往往多嗜冷物也。

茯苓半夏湯。治妊娠惡阻。心中憤悶。嘔吐惡心。好噉鹹酸物。

旋覆花

陳皮

桔梗

白芍

人參

甘草

芎藭

赤茯苓

乾熟地

半夏

湯洗十遍
一兩一分

各半

分

右爲麤末。每服二錢。水盞半。薑四片煎八分。去滓食前稍熱服。

清平湯。治血虛口燥咽乾喜飲。

人參

半夏

麥門冬

芍藥

白朮

甘草

當歸

茯苓

柴胡

各等分

右咬咀。每服二錢。水盞半。燒生薑一塊切破。薄許少許。同煎七分。去滓熱服。不拘時。

○第二十七問。婦人喜少怒多。悲泣不止者。何也。

答曰。婦人無故悲泣不止。象如神靈。或以祟祈禳。

女科百問

終不應。金匱謂之燥臟是也。爲所欲不稱其意。太
棗湯主之。

太棗湯治婦人臍燥

甘草

一兩

小麥

三合

右咬咀。每服三錢。水盞半。棗五枚。煎八分。去
渣溫服。

○第二十八問咽中狀如梅核。或如炙肉者。何也。
答曰。有喉嚨。有咽門。二者各有所司。喉嚨者。空虛
也。肺之系。氣之道路也。肺應天。故屬大氣所生。有
九節以通九竅之氣。咽者。嚥也。言可嚥物。爲胃之

如炙肉之臠也

氣喘急或因痰飲節注嘔吐惡心

兩五

兩四

三十一

兩二

右爲咬咀每服四錢。水盞半薑七片棗一枚

煎六分。去滓熱服。不拘時。

二氣散。治陰陽痞結。咽膈噎塞。狀若梅核。妨礙飲食。久而不愈。卽成翻胃。

山梔子

炒

乾薑

炮各一兩

右爲麤末。每服二錢。水一盞。煎五分。去滓熱服。食遠。

○第二十九問。婦人足十指痛如油煎。覆之則熱。痛風吹則冷痛者。何也。

答曰。孫真人云。有脚氣之人。先從脚起。或先緩弱。起行忽倒。或兩脛腫滿。或膝枯細。或心中忪悸。或

小腹不仁。或舉動轉筋。或見食嘔逆。惡聞食氣。或胸滿氣急。或遍體酸痛。皆脚氣候也。黃帝所謂緩氣濕痺是也。頑弱名緩風。疼痛爲濕痺。寒中三陽所患必冷。暑中三陰所患必熱。婦人足十指如熱油煎者。此繇榮衛氣虛。濕毒之氣留滯經絡。上攻心則心痛。下攻脚則脚疼。其脚指如熱油所煎。亦氣之類。經云熱厥是也。

換腿丸。治一切脚氣。卽石楠丸。

石楠葉

天南星

炮

金釵石斛

萆薢

牛膝

酒浸

薏苡仁

羌活

不蛀

川續斷

天麻

劉

防風

去

當歸

黃芪

甘草

各一兩

檳榔

二兩

乾木瓜

四兩

右為細末。酒糊為丸。桐子大。每服五十九漸

加至一百丸。溫酒或木瓜湯下。空心食前

萬靈散。治婦人脚氣

當歸

赤芍

烏藥

青皮

各一兩

白朮

肉桂

各半兩

黑牽牛

二兩

右為麤末。每服三錢。水盞半。酒少許。煎八分。

去滓。溫服。食前

活血丹。治婦人脾血久冷。諸般風邪濕毒之氣。

經絡流注脚手筋脉拳攣或發赤腫行步艱辛腰腿沉重脚心弔痛及上衝脇腹膨脹胸膈痞悶不思飲食衝心悶亂及一切痛風走注渾身疼痛

川烏

兩

乳香

一錢半
另研

草烏

一兩
地龍
兩

天南星

兩

沒藥

三錢半
另研

牛膝

一兩
木瓜
兩

右爲細末入研藥酒糊丸梧子大每服二十

丸空心日午冷酒下或荆芥湯清茶亦得

○第三十問婦人少年髮少者何也

答曰是少陽膽之經其榮在髮足少陰腎之經其

華在髮衝任之脉爲十二經之海。謂之血海。其脉絡上唇口。若血盛則榮於頭鬚髮美。若血海弱則經脉虛竭。不能榮潤。故髮少而禿。或有純赤黃者。生髮藥。

蔓荊子

青箱子

蓮子草

各一兩

附子

二

頭髮灰

一匙

右爲末。以酒漬。納甕器中。封閉。經二十七日。藥成。以烏雞脂和塗之。先以米泔洗髮。然後傅之。數月生長一尺也。

生眉毛

七月七日烏麻陰乾爲末烏麻油和塗眉即生妙

滋陰養血丸治勞虛血弱肌肉枯燥手足多煩肢節酸疼鬢髮脫落面少顏色腹拘急痛引腰背去血過多崩傷內竭胸中短氣晝夜不能眠情思不樂怔忡多汗

熟地

當歸

各一兩

鹿茸

二兩
酥炙

右爲細末蜜丸桐子大每服五十丸米飲湯任下不拘時

○第三十一問四肢如故但腹脹者何也

答曰。身腫及四肢者。本起於水。手足瘦削腹大者。本起於脾。或脹滿或散者。氣也。然腹脹之狀。上下膨亨。或鼓之有聲。喘息不便。繇上者不降。下者不升。氣痞於中。無所歸息。三焦渾亂。若猝然脹滿。餘無所苦。此繇脾胃不調。冷氣暴折。客乘於中。寒之則氣收聚。壅遏不通。是以脹滿。內經云。臟寒生滿。病是也。若臍凸者難治。大便利者為逆。

沉香導氣丸順氣消腫

黑白牽牛

各一兩

炒共

青皮

去白同

陳皮

去白同

檳榔

半兩

剉碎用巴豆五十粒去皮膜將三味炒黃色去

巴豆
不用

沉香

全蝎炒

革澄茄

丁香

胡椒

各半兩

續隨子

一錢研

蘿蔔子

炒三兩

甘遂

半兩制炒黃色

右為細末用葱

白研如膏和丸桐子大每服

二十丸炒酒醪煎湯下醋湯亦得

神助丸治四肢瘦肚大

三稜

草果子仁

川練子

各一兩醋一兩乾乾焙燥

茴香

蘿蔔子

粟子內皮

各一兩

右為末醋糊丸桐子大蘿蔔湯送下五十丸

虛者三十丸

○第三十二問病有血分有水分何以別之
答曰婦人月經通流流則水血消化若風寒搏於
經脉血結不通血積爲水故曰血分若先病於後
經水或斷名曰水分其病易治去其水經自下也
若病人覺腹內脹外視如常大便黑小便赤是其
證也

椒仁丸治因經水斷絕後致四肢面目浮腫小便
便不通名曰血分水化爲血血不通則爲水矣

五靈脂

吳茱萸

更

湯洗七次
醋浸炒

玄胡索

各半兩

芫花

醋浸一宿
炒焦一分

椒仁

甘遂

炒黃

續隨子

郁李仁

去皮研

牽牛

炒熟各半兩

信砒

研一錢

石膏

研一分

附子

炮熟半兩

木香

半兩

膽礬

錢

右爲細末。麪糊爲丸。如菉豆大。橘皮湯下一丸。臨臥未通空心加一丸。腹未通日午再一服。

葶藶丸。治因小便不利後身面浮腫致經水不通。名曰水分。其餘逆順竝同水氣。

葶藶

炒

續隨子

去皮研各半兩

乾漆

一兩

右爲末。棗肉和丸。桐子大。煎扁竹湯下七丸。

如大便利者。減葶藶。續隨子各一分。加白朮半兩。

○第三十三問。心腹痛。或又有小腹痛者。何也。

答曰。經云。五臟猝痛。何氣使然。岐伯對曰。寒氣稽留於脉外。故猝然而痛也。舉痛論中所載痛病。共有一十七證。皆繇寒氣之所致也。巢氏云。痛是臟虛受風冷。邪氣乘心也。其痛發有死者。有不死成疹者。心爲諸臟主而藏神。其正經不可傷。傷之而痛者。各爲真心痛。朝發夕死。夕發朝死。若腑臟虛弱。風邪客於其間。痛隨氣之上下。或上攻於心。則

心痛下攻於腹則腹痛。上下相攻則心腹俱痛。或宿有風冷搏於血。血氣停結。小腹痛也。

醋煎散。治婦人血氣腹脇刺痛。及產後敗血。兒枕急痛。

高良薑

兩一

當歸

肉桂

白芍

橘紅

烏藥

各半兩

右爲細末。每服三錢。水醋各半。盞煎七分。通口服。不拘時。

木香通氣丸。治氣刺疼痛。

京三棱

蓬朮

各半兩

木香

木香

續編

大腹

各

右將米醋三觔同煮令醋盡獨去芫花炒令乾餘五味切片子焙爲末白麪糊和丸如豌豆大橘皮湯下三十丸以止爲度

玉抱肚治停寒痼冷疾心腹刺痛常繫於臍腹間甚妙鄭主簿傳一方用針砂如上法炒訖止入硃砂半兩並不用餘藥

針砂

一兩鐵銚內炒用柳條或小白礬竹不住手攪相出爲度放冷

粉霜

錢各二

硃砂

兩半

右件白礬等三味同研爲細末與針砂拌和

作一服以水數點貼闊二寸以上長疼處或常繫臍下藥力過再灑水如五次藥力退則將可用

五香拈痛丸

木香

官桂

藿香葉

沉香

右八味爲細末白

丁香

乳香

半班猫

七枚

巴豆

三粒去油

麴糊丸梧桐子大每服五

十九薑湯送下

○第三十四問下利經水反斷者何也

答曰穀入於胃脉道乃行水入於經其血乃成胃水穀之海也腸胃虛弱爲風邪冷熱之氣所乘不能腐化穀食先泄後變成利也受熱則赤虛寒則白穀氣內虧津液耗減所以下利而經水反斷也經云利止經當自下故宜先治利也

大斷下丸治下利不止

附子

二兩

細辛

去蘆一兩半

乾薑

三兩

高良薑

五兩

肉豆蔻

訶子

各二兩

龍骨

赤石脂

各三兩

牡蠣

醋洗泥固濟火煨二兩

酸石榴皮

去穢醋炙心存性二兩

白礬

二兩火飛陽起石

火燒赤醋淬別研三兩

右為細末麵糊丸

梧桐子大每服五十丸

飲空心下

滲濕湯治濕勝濡泄

白朮

一兩半蒼朮

兩厚朴

肉桂

丁香

乾薑

陳皮

細辛

白茯苓

各一兩

肉豆蔻

半兩砂仁

附子

二隻八錢者令赤去薑先

同薑炒炮切片

右為麤末每服四

錢水盞半薑五片棗二枚

煎一盞食前熱

第三十五問婦人
狀者何也

答曰此婦人因傷寒之
之室者屋室也謂可以
榮血停止之所經脉亞
海玉冰云陰靜海滿正
脉盛月事以時下者
之所搏則熱入血室
見鬼狀者此爲熱

則明了暮則譫語如見鬼

病熱入於血室也何以明
停止之處人身之血室者
會之處卽衝脉也衝爲血
去血內經云任脉通太衝
也若經水適來感其寒邪
證晝則明了暮則譫語如
室也若施治其病者當無

犯胃氣及上二焦必自愈

地黃湯治熱入血至

生地

三兩

柴

入

人參

黃芩

甘草

炙各半

湯

炮七次

右為麤末每服五錢水二盞薑五片棗一枚

煎一盞去滓溫服

龍齒琥珀散治產前產後血虛心神恍惚語言

失度睡臥不安

茯神

一兩

人參

龍齒

琥珀

赤芍

黃芪

牛膝

去蘆各三分

麥門冬

去心

女科百問

上明

生地

各一兩半

當歸

兩半

右爲麤末每服

三錢水盞半煎六分去滓溫

服不拘時

小柴胡加地黃湯治傷寒發熱或發寒熱經水
適來或適斷晝則明了夜則譫語如見鬼神亦
治產後惡露方來忽然斷絕

柴胡

一兩一分

人參

各半

半夏

一分

黃芩

甘草

一分

生地

各半

右咀片每服五錢水二盞薑三片棗一枚煎
八分去滓溫服

復丹亦名正一丹此藥配類二氣均調陰陽
寧天地冲和之氣乃水火既濟之方可治
可緩可急善治榮衛不交養心腎不升降上
下虛氣閉痰厥心腹冷痛臟腑虛滑但有胃氣
無不獲安

硫黃脂上透明者一兩

硝石一兩同硫黃並為細末入定鍋內微

火炒用木篋子不住手攪令陰陽氣相入不可火太過恐藥力竭再研細名二氣末

太陰玄精石研水飛一兩五靈脂須五臺山者水澄去砂日乾研

陳皮去白青皮去白各二兩

右用五靈脂二橘皮為細末次入玄精石末

及前二藥末拌勻。好醋打糊爲丸。豌豆大。每服三十粒。鹽湯下。甚者五十粒。

○第三十六問顛狂之病。何以別之。

答曰。入并於陰則爲顛。入并於陽則爲狂。皆繇風火之所致也。顛者猝然仆地。嘔吐涎沫。口噤目急。手足撩戾。無所覺知。良久乃甦。狂者或言語不避親疎。或因自高賢。或棄衣踰走。亦有自定之時。又在有胎之時。其母猝大驚。亦令子氣發癇。其顛有五。一曰陽顛。二曰陰顛。三曰風顛。四曰濕顛。五曰勞顛。此皆隨其感病之繇而命名也。又有牛馬猪

其顛發之時聲形狀似於牛馬等故以為
也俗云病顛之人忘食六畜肉顛發之狀悉皆
象之

大聖一粒金丹治諸風驚癇

大川烏頭

二兩

黑附子

白附子

各二兩

五靈脂

白蒺藜

炒去刺各一兩

沒藥

半兩別研

白殭蠶

絲炒一兩去

白礬

枯半別研

麝香

半兩淨肉

細香墨

半兩別研

朱砂

半兩別研

金箔

二百片為衣

右將前六味同為細末後四味研細合和用

井華水一盞研墨盡為度將墨汁搜和杵曰

內搗五百下。丸如彈子大。金箔為衣。陰乾。每服一粒。食後臨臥。生薑自然汁磨化。入熱酒。服。再以熱酒隨意多少飲之。就無風。暖處臥。衣被蓋覆。汗出即差。病小者。每粒分作二服。忌發風物。孕婦不可服。

牛黃丸治風狂喜怒不常或欲狂走

白龍骨

燒

鐵粉

研

茯神

人參

黃連

鉛霜

犀角

屑

防風

朱砂

各一兩研

牛黃

一錢研

遠志

一兩去心

龍腦

一錢研

甘草

半兩炙

麥門冬

一兩去心

右爲細末如桐子大每服二十九丸熱水送下
不拘時服

祛邪散治顛邪惡候

白礬

三兩
生研黃丹 半兩

右爲研細用桑柴於瓦中燒一伏時服半錢
以乳香湯下不拘時

小柴胡加地黃湯方見三十五問每服五錢水
二盞薑五片棗二枚煎八分去滓溫服
來復丹治產後熱入血室如見鬼神狂語者方
見三十五問以醋湯下十來服

第三十七問病有一臂痛有兩臂俱痛何也

答曰臂痛有數證有因寒而得之者或因伏痰者有形寒飲冷傷肺者有汗出傷阻者夫肝主諸筋肝經虛弱風寒入傷與氣血相搏筋寒則急上連兩臂俱痛宜服醒風湯理氣湯主之若或左或右痛不能舉臂者此繇伏痰在內中腕停滯脾氣不能流行止與氣搏流伏於左則左痛在右則右痛若右臂痛深連於骨如斧槌其氣自噬已下至臍左右氣不相通徹其痛發時氣上奔急令人悶絕肌肉曰消漿粥不下心中煩問此繇形寒飲冷肺

被寒結留滯於右邊若無故一臂無力痛不能舉
襲襲似汗偏阻一邊肌肉時復掣痛或有不仁手
不能近頭久成偏枯宜服百風湯主之

百風湯治四肢垂曳骨節疼痛又名省風湯

獨活

三兩

芎藭

防風

當歸

桂心

各二兩

茯苓

附子

細辛

天麻

一兩

乾蝎

炒

甘草

一兩

右爲咬咀每服三錢水一盞生薑五片煎七

分主滓食前稍熱服

茯苓丸治伏痰臂痛

茯苓一兩 半夏二兩

枳殼去穰 炒半兩

風花桂硝一分

右爲細末薑汁煮糊爲丸如桐子大每服三十丸食前薑湯下

理氣湯治痰飲臂痛

半夏湯洗二兩 桔梗一兩

官桂二兩 人參一兩

橘皮洗乾二兩 甘草半兩

右爲麤末每服五錢水二盞薑五片煎一盞去滓食前服

第三十八問婦人渴病與三消之病同異

卷曰夫渴之爲病一也推其受病之源所得各異
精迷方論消渴之病自來有二多緣嗜慾太甚自
爲虛寒服五石湯丸猛烈燥藥積之在臟遂至精
血枯涸又久飲酒者酒性酷熱薰蒸於臟肺是致
津液耗竭渴乃生焉婦人之渴多因損血血虛則
熱熱則能消飲所以多渴故與男子之病有異也
栢子仁湯滋養榮衛調心順氣亦治上焦虛熱
煩燥口苦四肢倦怠津液內燥服之効

新羅參

黃芪

茯神

瓜蒌根

天門冬

法

麥門冬

法

甘草

各一兩

北五味

半兩炒

栢子仁半兩熟地二兩

右爲麤末每服五錢水一盞半薑三片棗三枚煎七分去滓溫服不拘時

辰砂聚寶丹治心肺積蘊虛熱口苦舌乾面赤大便滲泄肌肉瘦瘠四肢少力精神恍惚又治消渴消中消腎三焦留熱

鐵粉三錢牡蠣三錢辰砂半兩瓜蒌根半兩

黃連二錢金銀箔各五十片知母三錢

新蘿參半兩白朮半兩黃芩半兩茯苓半兩甘草半兩

右件瓜蒌根等五味同前藥末用生瓜蒌

根去皮。取汁一盞。白沙蜜一小盞。同銀器中
煉七八沸。候冷和藥爲丸。如梧桐子大。每服
三十丸。煎麥門冬湯放冷送下。食後一日之
間三服。

○第三十九問腰痛如折者何也

答曰。腰者。腎之外候。足太陽經之所流注。若痛連
小腹。不得俛仰。懷懨短氣。此繇腎氣虛弱。勞傷過
度。風冷乘之。有所不榮。故腰痛也。內經云。腰者。腎
之腑。轉搖不能。腎將憊矣。若妊娠腰痛者。其胎必

墮也。

婦科百問

杜仲散

杜仲

去皮并爛酒浸一宿焙一兩

官桂

牡丹皮

各一兩

右爲細末。溫酒調二錢不拘時服

當歸丸

當歸

切洗三兩

水蛭

炒三枚

桃仁

去皮研三十粒

右爲細末。酒煮糊丸如桐子大。溫酒下十丸。

未愈加至三十丸

腎着湯。治身體重。腰冷痺。如坐水中狀。反不渴。小便自利。飲食如故。病屬下焦。從身勞汗出。衣裏冷濕。久而得之。腰以下冷痛。腰重如帶五貫。

錢重者

甘草

乾薑兩二茯苓

白朮各四兩

右爲麤末每服五錢水二盞去滓溫服不拘時

○

第四十問婦人面多生黑𤑔與黑子者何也

答曰黑𤑔黑子者皆生於面上本是二證也五臟六腑之經血華充於面或痰飲清臟或腠理受風致血氣不和或澁或溫不能榮於皮膚故變生黑𤑔若黑點凝聚謂之黑子者生面有之者非藥可治也

洗風散治面止遊風或癰疹或風刺或黑疔

空蔚草

晚蠶沙

赤小豆

黑牽牛

白芷

藁本

僵蠶

白附子

草烏頭

白歛

蔓荊子

右件等分爲末每一錢澡面用之

●第四十一問身目黃者何也

答曰黃疸之病皆屬於脾脾屬土而色黃濕勝則上氣不流痰熱鬱發則眞色見矣大抵黃疸本得之於濕濕熱相搏身必發黃若先有流熱後有濕氣者先治其熱梔子蘘皮湯茵陳五苓散主之或

先感其濕。後加其熱者。先去其濕。五苓散。瓜蒂散。主之。亦有因冷氣痞結於脾陰。濕鬱而爲黃。先瀉其痞。半夏瀉心湯。枳實理中湯。主之。然後利其小便。若病人一身面目悉黃。四肢微腫。胃滿不得臥。汗出如黃蘗汁者。此繇大汗出。猝入水中所致。謂之黃汗。宜苦酒湯。若非濕熱所鬱。婦人面萎黃者。亡血之過也。宜服地黃散。滋陰養血丸。方見第三十問。

苦酒湯

黃芪

五兩

芍藥

三兩

官桂

三兩

右爲咬咀每服五錢水盞半苦酒半盞煎一盞去滓溫服不拘時

地黃散治婦人血少氣多寒面色青白

地黃

乾薑

各一兩

右爲細末每服二錢溫酒調下不拘時

茵陳五苓散

豬苓

去皮

茯苓

澤瀉

白朮

各一兩

官桂

去皮五錢

右爲細末以茵陳一分水一盞煎七分去滓

調服加鹽點妙

瓜蒂散

瓜蒂

赤小豆

秫米

各一兩

右爲細末。粥飲調下半錢。以吐爲度。

藥皮湯

藥皮

三兩

梔子

二兩

甘草

一兩

右爲麤末。每服五錢。水二盞煎八分。去渣。

服

○第四十二問陰崩陽崩何以別之。

答曰。夫血氣之行。外行經絡。內榮腑臟。皆衝任二脉之所主也。倘若勞傷過度。致腑臟俱傷。衝任經

虛不能約制其血。故忽然暴下。謂之崩下。經云。三焦絕經。名曰血崩。又熱而赤者。謂之陽崩。受冷而白者。謂之陰崩。其白者。形如涕。赤者。形如絳。黃者。形如爛瓜。青者。形如藍色。黑者。形如衄血。是謂五崩也。當與第六問。恭看。

陽崩膠艾湯。治婦勞傷血氣。衝任虛損。月水過多。淋漓漏下。連夕不斷。臍腹疼痛。

阿膠

炒

川芎

甘草

各二兩

艾葉

當歸

各三兩

白芍

熟地

各四兩

右爲飲子。每服三錢。水一盞。煎六分。去滓。熱

服。空心食前。甚者連夜並服之。

黃芩散。治崩中下血。

黃芩爲末。每服一錢。燒秤鎚酒調下。崩中多是止血藥。此法治乘陰。經所謂天暑地熱。經水沸溢者也。

陰崩固經丸。治婦人衝任虛弱。月候不調。來多不斷。淋漓不止。

艾葉醋炒

鹿角霜

伏龍肝

各等分

乾薑

右爲末。溶鹿角膠和藥。乘熱丸。梧桐子大。食前淡醋湯下五十丸。

赤龍丹治崩漏不止餘血作痛

禹餘糧煨

烏賊骨

鹿茸

酒炙

龍骨

乾薑

當歸

石燕子

煨

阿膠炒

右等分爲末酒醋糊丸桐子大每服五十丸
溫酒下艾醋湯亦得

○第四十三問眠臥多汗者何也

答曰盜汗者因眠臥而身體流汗也此緣陽虛所致久不已令人羸瘦心虛不足亡津液故也診其脉虛弱細微皆盜汗脉也

大建中湯治熱自腹中或從背脊漸漸蒸熱或

婦人血氣不足

經水不調

黃芪

黃芪

遠志

當歸

澤瀉

龍骨

人參

甘草

吳木

右為麤末

每服五錢水二盞薑三片棗一枚

擘破人飴少許煎一盞食前溫服

黃芪飲子治婦人血氣不足夜間虛乏有汗倦

怠者

黃芪

五味子

當歸

白茯苓

各半兩

白芍

遠志

麥子一方用麥門冬

人參

吳木

各一甘草三

右咬咀每服三錢水盞半薑三片煎七分去

滓溫服不拘時神驗

加味理建湯治男子婦人夜多盜汗并便濁者

此方昌國州方順齋傳到經驗

乾薑

吳木

人參

黃芪

白芍

肉桂

甘草

牡蠣

浮麥

當歸

右件咬咀每服水二盞薑五片棗一枚煎八

分食前熱服渣再煎

身四十四問左脇痛如刀刺不得喘息者何也
答曰肝居脇之左以藏血鍼經云邪在肝兩脇痛
巢氏云左脇偏痛者繇經絡偏邪客於傍之故也
人之經絡旋環於身左右表裏皆周遍若血氣調
和不生虛實痛證或偏者邪傷之也其左脇痛如
刀刺者則知其邪偏客於左也甚者不得喘息也
醋煎散治婦人血氣腹脇刺痛

良薑

一兩

當歸

肉桂

白芍

陳皮

烏藥

各半兩

右爲細末每服三錢水醋各半盞煎七分通

口服

趁痛散。治血氣刺痛。起於一邊。或左或右。行環上下。或在肌肉之間。如錐刀所刺。其氣不得息。

蓬朮

官桂

各一兩

檳榔

半兩

芫花

醋炙

附子

各一兩

細辛

半兩

右爲飲子。每服三錢。水盞半煎七分。去滓溫服。薑棗同煎。

○第四十五問。積聚之病。何以別之。

答曰。積聚者。繇陰陽不和。腑臟虛弱。受其風邪。搏於腑臟之氣所爲也。積者。五臟所生。聚者。六腑所

生然陽化氣。氣屬於六腑。陰成形。形主於五臟。陽則動而不息。故聚者。始發無根本。上下無所留止。其痛無常處。故謂之聚也。陰則定而守住。故積者。始發有常處。其痛不離其部。上下有所終始。左右有所窮處。乃謂之積也。積脉陰沉而伏。象陰體之沉靜。聚脉陽浮而動。法陽性之浮高。然積病有五。隨其五臟相傳而生焉。經云。在肝則曰肥氣。在心則曰伏梁。在脾則曰痞氣。在肺則曰息賁。在腎則曰奔豚。故曰積聚之病。此可別也。

蠶甲丸。治小腹中積聚。大如七八寸盤面。上下

周旋痛不可忍

鱉甲

官桂

各一兩半蜂房

川椒

細辛

人參

苦參

丹參

沙參

吳茱萸

各十錢麝蟲

乾薑

牡丹皮

附子

水蛭

皂角

一本牛白角肥

當歸

赤芍

甘草

防葵

各一兩

蟻螯

二十枚

大黃

蜚蠊

玄參

十八錢

右為細末蜜丸桐子大每服七丸溫酒下日

三服加之以効為度

沒藥散治婦人一切血氣臍腹撮痛

血竭研別

肉桂

當歸

蒲黃

紅花

木香

沒藥

玄胡索

乾漆炒令烟出盡

赤芍各等分

右為知末每服二錢熱酒調下食前

紫金散治婦人血氣不和血塊疼痛常服煖子

宮通經絡

橘紅

枳殼

肉桂

玄胡索

甘草

各兩紫金牛五兩一本

當歸酒浸一宿焙乾

香附各三兩

南木香半兩生

右為末婦人室女月水不調久閉羸瘦蘇木

煎湯調下。白雞冠花末煎酒調下亦得。每服
一匙。常服安胎養氣。臨產橫逆。葱白煎酒下。
血氣脹滿。催生下死胎。煎枳殼酒下。地榆末
煎酒下亦得。產後血運。頭旋中風。口禁惡證
發動。虛腫。豆淋酒下。產後惡血不止。血海衰
敗。赤白帶下。胞漏。棕櫚灰酒下。綿灰亦得。胎
氣絞刺。肋脇腹肚疼痛。炒薑酒下。心氣不足。
陳皮湯下。產後敗血停積。攻刺腰痛。無灰酒
下。日午臨睡三服。忌生冷滯藏毒魚。

○第四十六 問身體常瘙痒者何也

身癢痒者。是體虛受風。風入腠理。與血氣相搏。而俱往來。在皮膚之間。邪氣散而不能衝擊。爲痛。故但癢痒也。仲景云。痒者名泄氣風。久久成癩。癩亦繇體虛受風邪之所致也。

胡麻散治脾肺風毒。攻衝遍身。皮膚癢痒。或生瘡疥。或生癰疹。用手搔時。浸淫成瘡。久而不愈。而復作。面上遊風。或如蟲行。紫癍白癍。頑麻。等風。或腎臟風。攻注腳膝生瘡。並宜服之。

胡麻

三兩

苦參

二兩

何首烏

二兩

甘草

炙

荆芥

三兩

歲靈仙

一兩

右爲細末每服二錢薄荷湯茶點食後服或酒調蜜點亦得服此後頻頻洗浴得出汗而立効

苦參丸治心肺積熱腎臟風毒攻於皮膚時生疥癩搔痒難忍時出黃水及大風手足爛壞眉

毛脫落一切風疾並皆治之

苦參

四兩

荆芥

去梗三兩

右爲細末水糊丸如桐子大每服二十丸好茶吞下或荆芥湯食後

○第四十七

問夜與鬼交者何也

答曰。人有五臟。臟有七神。臟氣盛則神強。外邪鬼魅不能干犯。若攝養失節。而血氣虛衰。鬼邪侵損。故婦人夢中多與鬼魅交通。其狀不欲見人。如有對忤。并獨言獨笑。或時悲泣者。是也。其脉來遲。或如鳥啄。顏色不變。皆邪物病也。說今宮中人。尼師。寡婦。曾夢中與鬼魅交通。邪氣懷感。久作癥瘕。或成鬼胎。往往有之。

茯神散。治婦人風虛。鬼神交通。妄有所見聞語。言雜亂。

茯神

半兩

茯苓

人參

菖蒲

各一兩

赤小豆

半兩

右咬咀每服三錢水一盞半煎六分去滓溫

服食前

治女人與鬼神交通獨言獨笑或悲或思或謳

謠恍惚

松脂

三兩炒

雄黃

一兩研末

右二味用虎爪攪勻丸如彈大夜內籠中燒之令女裸坐籠上彼急自蒙唯出頭耳過三

薰即斷

秦丞相灸法狐魅神邪及癲狂病諸般醫治不

差者。以併兩手大拇指。用綠絲繩急縛之。灸三壯。艾著四處。半在甲上。半在肉上。四處盡燒。一處不燒。其疾不愈。神効不可量也。小兒胎癰驚癰。一依此法灸之。一壯炷如小麥。妊婦亦妙。黃帝灸法。治療神邪鬼魅。及癲狂病。言語不擇尊卑。灸上唇裡面中央肉弦上一壯。炷如小麥子。大用鋼刀決斷更佳也。

○第四十八問。大小便不通者。何也。

答曰。大腸者。傳導之官。變化出焉。傳者。傳其不潔之物也。上與肺合。膀胱者。州都之官。津液藏焉。氣

化則能出矣。化者，化其溲便之泄注也。內與腎合，或臟腑不和，榮衛不調，使陰陽二氣失升降之道，致大小二腸為秘結之患。巢氏云：熱則秘結，寒則鴨澹，熱搏於大腸則大便不通，熱結於小腸則小便不通。令大小便不通者，是大小二腸受客熱所結也。小腸受熱，化物不出，是致膀胱不能使溲也。故便血尿血者，皆繇熱之所使也。

枳杏丸治臟腑堅秘澀少

杏仁

一兩湯泡去皮尖別研

枳殼

二兩先研為末

右為細末，神麴糊為丸，桐子大。每服四十或

五十丸。食前米飲薑湯下。

麻仁丸。治津液虧少。大便結秘。

麻仁二兩 枳實四兩 白藳沙去

芍藥四兩

大黃炮四兩 厚朴二兩 杏仁二兩

右為末。蜜丸。桐子大。米飲下。二十丸。未通加。

至三十丸。

石葦飲子。治氣淋。小遺澀痛。

石葦浸剝皮一兩 瞿麥

木通各一兩

陳皮 茯苓 芍藥

桑白皮

人參 黃芩各三分

右為細末每服二錢水一盞半薑五片煎七分去滓溫服。咳阻亦得。

真珠丸常觀血之流行起自於心。聚之於脾。藏之於肝。此三經者皆心血所係之處也。若三經守節則血濡養而安和。苟一臟有傷則血散溢而為咎。指迷方云小便赤色不痛不澁者非熱非淋。經氣乘心。心氣散溢而無所歸。滲入下經。故治之多用心藥。宜服真珠丸。

真珠母

未鑽者三分研如粉

栢子仁

研當歸各一兩

人參

沉香半兩

酸棗仁

炒去皮研

厚朴

熟地

酒浸洗蒸
乾一兩半

茯神

去木

各半

本為細末蜜丸桐子大辰砂

為衣每服四二

丸加至五十丸金銀薄苛湯

下日午臨臥

各一服

○第四十九問帶下三十六疾者

何也

答曰帶下者繇勞傷過度損動經

血致令體虛受

冷風冷入於胞絡搏其血之所成

也諸方說帶下

三十六疾者是十二癥九痛七害

五傷三因謂之

三十六疾也十二癥者是所下之

物一者如膏二

者如青。三者如紫。四者如赤皮。五者如膿痂。六者如豆汁。七者如葵羹。八者如凝血。九者如青血。血似水。十者如米汁。十一者如月澹。十二者經度不
應期也。九痛者。一者陰中痛傷。二者陰中淋痛。三
者小便刺痛。四者寒冷痛。五者月水來腹痛。六者
氣滿肚痛。七者汗出陰中如蟲螻。八者脇下皮
膚痛。九者腰痛。七害者。一者害食。二者害冷。三者
害氣。四者害勞。五者害房。六者害如。七者害睡。五
傷者。一者腹吼痛。二者陰中寒熱。三者小便急
牽痛。四者藏不仁。五者子門不正。引背痛。三因

一本或作固

一者月水閉塞不通其餘二固者文闕不

載三因方論云三固者形羸不生肌肉斷緒不產經水閉塞名品雖殊無非血病多因經絡失於調理產蓐不善調護內作七情外感六淫陰陽勞逸飲生冷遂致榮衛不和新陳相干隨經敗濁淋露凝爲癥瘕流溢穢惡痛害傷痼犯時微若秋毫作病重如山岳古人所謂婦人病比男子十倍難治而張仲景所說三十六種疾皆錄子臟冷熱勞損而夾帶起於陰內也條目混混與諸方不同但仲景義最玄深非愚淺者能解恐其文雖異而義同

也

養氣活血丹治勞傷衝任帶下異色

大艾葉

炒焦取細末五兩

乾薑

炮紙末二兩

右二條用好醋二升半無灰好酒二升生薑自然汁一升艾葉末同調於銀器內慢火熬

成膏方入後藥末

附子

三兩半

白芍

白朮

椒紅

各二兩半

川芎

當歸

紫

巴戟

去心糯米炒

人參

五味子

各兩

右爲細末入前藥膏子并炒熟白麵二兩半

同和勻爲劑。入杵臼內搗千下。丸如桐子大。每服五十丸。溫酒或米飲。食前任下。

紫桂丸。補益血海。治衝任氣虛。經脉不調。或多或少。腰疼。腹冷。帶下。崩漏。

禹餘糧火煨醋淬七次三兩 龍骨 艾葉醋炒

牡蠣 赤石脂 地榆各二兩 厚朴

牡丹皮 阿膠蛤粉炒 當歸 白芷

吳茱萸湯洗七次 肉桂各一兩 附子半兩

右爲細末。麵糊丸。桐子大。每服三十丸。濃煎

艾醋湯。空心下。常服。

○第五十問婦人有帶下。或淋漓不斷。何以別之。
答曰。產戶有三門。一曰胞門。二曰龍門。三曰玉門。
衝任二脉行於中。已產者屬胞門。未產者屬龍門。
未嫁者屬玉門。病源云。陰陽過度。勞傷經絡。故風
冷乘虛而入胞門。損衝任之經。傷太陽少陰之氣。
致令胞絡之間。穢液與血相稱。兼帶而下。冷則多
白。熱則多赤。久而則為淋瀝之病也。

大補益當歸丸。治婦人諸虛不足。

當歸

續斷

乾薑

阿膠

甘草

川芎

兩各一

吳木

吳茱萸

附子

白芷

芍藥

官桂

地黃

各一兩半

右爲細末。麴糊丸。如桐子大。每服五十九。溫酒或鹽湯下。食前。